

Über die
Verwendung der Drainage bei Laparotomien.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde in der Medizin und Chirurgie,

welche

mit Genehmigung der hohen med. Fakultät

der

vereinigten Friedrichs-Universitäten Halle-Wittenberg

zugleich mit den Thesen

am Montag, 29. November 1897, Mittags 12 Uhr,

öffentlich verteidigen wird

Philipp Huschenbett

aus Heiligenstadt (Eichsfeld).

Referent: Herr Geheimrat Prof. Dr. **Fehling**.

Opponenten:

Herr Dr. med. **Wedekind**.

Herr cand. med. **Staffler**.

Heiligenstadt

Brunn'sche Buchdruckerei

1897.

Imprimatur
Prof. Dr. FRÄNKEL
h. t. Decanus.

Seiner Mutter

in dankbarer Liebe

gewidmet

der Verfasser.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

So oft auch im Laufe der Jahre seitens der Gynäkologen die Frage nach dem Werte oder Unwerte der Drainage bei Laparotomien aufgeworfen und Gegenstand eifrigster Diskussionen geworden ist, so ist doch die Entscheidung derselben auch heute noch keineswegs abgeschlossen.

Es handelt sich hierbei in erster Linie um Laparotomien wegen Pyosalpinx, Tubo-Ovarialabscessen, Cystadenomata purulenta, verjauchten Myomen, kurz bei Operationen solcher Geschwülste, wobei sich Eiter oder Jauche in die Bauchhöhle ergießt und somit die Möglichkeit einer Infektion des Peritoneums durch Eitererreger besteht.

Soll man in einem solchen Falle nach Beendigung der eigentlichen Operation den Bauchschnitt primär vernähen, oder soll man drainieren und was sind speciell die Indikationen zur Drainage?

Das sind die drei fraglichen Punkte.

Vielgestaltig sind nun die Überlegungen, die bei der Beurteilung jener Fragen sich aufdrängen.

Zunächst möge hervorgehoben werden, daß wir bis jetzt kein sicheres Mittel kennen, welches uns vor der Operation über die Natur des fraglichen Eiters Aufschluß geben könnte. Weder die Anamnese, noch das Verhalten der Temperatur, noch sonstige objektive Symptome geben hier untrügerische Anhaltspunkte.

Die Natur des Eiters müßte also während der Operation selbst festgestellt werden, und zwar durch die mikroskopische Untersuchung.

Entweder ist der Eiter, der sich in die Bauchhöhle ergossen hat, frei von Bakterien, dann ist gleichzeitig die Diskussion über die Frage nach der Drainage überflüssig, weil die Erfahrung uns gezeigt hat, daß das Peritoneum

sterilen Eiter verträgt. In solchen Fällen wird die primäre Naht der Drainage vorzuziehen sein.

Ähnlich verhält es sich mit solchem Eiter, der nur Gonococcen enthält, obgleich diesbezügliche Untersuchungen betreffs der Infektion des Peritoneums durch Gonococcen zur Zeit noch nicht als völlig abgeschlossen betrachtet werden können.

Doch bei dieser mikroskopischen Untersuchung kann schon der erste Fehler sich einschleichen, in der Weise, daß bei thatsächlichem Vorhandensein von Eitererregern solche nicht gefunden werden.

Sind nun wirklich Eitererreger, wie Staphylococcen oder Streptococcen, im Eiter nachgewiesen, so kommt zunächst die Frage nach ihrer Lebensfähigkeit in betracht, und über diese entscheidet das kulturelle Verfahren. Gehen die Kulturen nicht auf, d. h. sind die Bakterien abgestorben, dann würde ein primärer Verschluss des Peritoneums voraussichtlich nicht geschadet haben. Wieweit aber in solchen Fällen die Drainage einen günstigen oder ungünstigen Einfluß auf den Verlauf des Krankheitsprozesses ausübt, soll später besprochen werden.

Erweisen sich die Kulturen als lebensfähig, so rechtfertigt diese Erscheinung noch keineswegs einen Schluss auf ihre Virulenz, und hierin liegt sicherlich der Grund für die anscheinend so auffällige Thatsache, daß viele Fälle trotz des unzweifelhaften Nachweises von der Anwesenheit lebensfähiger Eitererreger einen vollkommen glatten Verlauf nehmen.

Auf der anderen Seite dürfte gerade auch diese Thatsache die großen Unterschiede in den Erfolgen der einzelnen Operateure erklären; denn wenn, bei annähernd gleichem Material, zwei Operateure, Martin und Zweifel, unter Anwendung der gleichen, oder doch wenigstens ähnlichen Operationsmethoden, in ihren Erfolgen Unterschiede von 13 % (Martin) und 0,7 % Mortalität aufzuweisen haben, so kann der Grund hierfür wohl kaum, wie Zweifel selbst angiebt, in der besseren Blutstillung seinerseits allein gelegen sein, sondern darin, daß sich die Fälle mit virulenten

Bakterien in der Statistik des einen zusammendrängen, während sie in der Statistik des anderen fehlen.

Endlich aber kommt noch folgendes in Betracht.

Über die Virulenz kann naturgemäfs nur der Tierversuch entscheiden. Diese aber äufsert sich nur gegenüber bestimmter Tierspecies. Es kann deshalb ein und dieselbe Kultur z. B. für Kaninchen hoch virulent sein, während sie sich für Meerschweinchen, Mäuse etc. als nahezu unwirksam erweist.

Zieht man den Schluß hieraus, so folgt, dass man nicht in jedem Falle aus dem Tierversuch einen sicheren Rückschluß auf den Menschen ableiten kann, weder bei positivem, noch bei negativem Ergebnis.

Diesbezüglich interessant und beweisend für die Richtigkeit der eben dargethanen Anschauungen sind die Tierversuche, die in der Dissertation des Herrn Dr. H. Cofsmann (Strafsburg) betitelt:

Bakteriologische Untersuchungen über die Virulenz und Infektiosität des Pyosalpinxciters in bezug auf das Peritoneum niedergelegt sind.

Cofsmann legte Kulturen aus am Pyosalpinx-Eiter an und infizierte mit demselben weiße Mäuse und Meerschweinchen.

Es zeigte sich dabei einmal, daß die Tiere gegen dieselbe Kultur außerordentlich verschieden reagierten, so daß das eine Tier kaum merklich erkrankte, während das andere in kurzer Zeit der Infektion erlag. Ferner ergab sich, daß die Erkrankung oder der Tod des Versuchstieres keineswegs immer auch das Bestehen einer Lebensgefahr derjenigen Patientin zur Bedingung machte, von der das infektiöse Material stammte. Im Gegenteil verliefen einige Fälle, in denen die Injektion einer Streptococcen-Kultur in die Bauchhöhle des Versuchstieres dessen Tod in kurzer Frist zur Folge hatte, vollkommen glatt und fieberfrei.

Aus allen diesen Erwägungen geht hervor, wie leicht derartige Untersuchungen zu Irrtümern und Täuschungen

führen können. So lange nicht während der Operation selbst festgestellt werden kann, ob infektiöser Eiter vorliegt oder nicht, — und bis zur Stunde hat man dieses Mittel nicht in der Hand, — so lange muß in zweifelhaften Fällen so verfahren werden, als wenn eine Infektion stattgehabt hätte.

Hierbei kann es nun eigentlich nur zwei Möglichkeiten der Überlegung geben: Entweder die Beseitigung der Erreger oder deren Unschädlichmachen.

Die Erfahrung hat uns darüber belehrt, daß bei einmal stattgefundener Invasion pathogener Mikroorganismen deren Beseitigung auf keine Weise gelingt, weder durch mechanische, noch durch chemisch-antibakterielle Maßnahmen.

Der zweiten Überlegung, die Bakterien unschädlich zu machen, kann man indessen eher gerecht werden, indem man dafür sorgt, ihnen nach Möglichkeit den Nährboden für ihre Existenz zu entziehen; und dieser Gedanke, die Werkstellung des Abflusses der Sekrete, leitet von selbst über zur

Drainage.

Sie soll die Sekrete ableiten, ihnen den Weg nach außen freilassen, und auf diese Weise eine allmähliche Austrocknung herbeiführen. Das ist die **erste und wichtigste Indikation** zur Drainage.

Doch die Anschauungen über die Wirksamkeit der Drainage sind so vielseitig, wie die Angriffe auf sie, die besonders von Zweifel und Martin erhoben werden.

Es müssen hierbei Vorteile und Nachteile erwogen werden. Wir wollen den Einwendungen weiter unten begegnen.

In Übereinstimmung mit vielen anderen Anschauungen gilt nun in der hiesigen Frauenklinik neben der Drainage bei Eitererguß ins Peritoneum als zweite Indikation zur Drainage eine nicht anders als durch Tamponade zu stillende parenchymatöse Blutung aus tiefen, nicht zu umstechenden Gefäßen.

Auch dieser Indikation ist von einigen Autoren lebhaft widersprochen worden. Zweifel leugnet überhaupt jede

parenchymatöse Blutung, erklärt sie zusammengesetzt aus vielen kleinen Einzelblutungen und will dementsprechend jedes Gefäßchen fassen oder so lange tupfen, bis die Tupfer rein aus dem Operationsfeld kommen.

Die Möglichkeit zugegeben, so bedingt doch ihre Ausführung eine unverhältnismäßig längere Narkose, ein Umstand, der gewiß in vielen Fällen sehr unangenehm in die Wagschale fällt. Außerdem aber ist das Mittel, durch Tamponade einer Blutung Herr zu werden, ein in der Chirurgie so gebräuchliches, daß kein Grund vorliegt, es gerade hier zu verwerfen. Zur Tamponade wurde jeweils Gaze nach Bedarf 1—5 Meter lang und 2—3 Finger breit genommen, sterile oder Jodoformgaze; die Gaze wurde in den zu drainierenden Raum oder an die zu tamponierende blutende Stelle lose in verschiedenen Lagen auf einander gelegt, das Ende durch ein in die Bauchwunde eingeschaltetes Glasröhrchen nach außen geleitet, welches den Zweck hat, die Ausziehung der Gaze aus der Bauchseite zu ermöglichen, ohne daß dabei die in ihr enthaltene Flüssigkeit ausgedrückt wird. Die Gaze wurde zwischen dem 3.—8. Tag, meist am 5. Tag völlig entfernt, event. dann eine Kautschukdrainage eingeschoben.

Bevor wir nun im besonderen auf die Besprechung der Erfolge bei Laparotomien und deren Beziehungen zur Drainage eingehen, wollen wir kurz die Krankengeschichten von 41 Fällen von Laparotomien wiedergeben, die Herr Professor Dr. Fehling aus seinem klinischen und privaten Material uns zu überlassen die Güte hatte.

Übersicht über bei denen die Drainage in die Bauchhöhle

Lfd. No.	Name, Alter, Wohnort	Jahr der Oper.	No. des Hauptbuches	Partus	Krankheit	Operation	Drainage in die Bauchhöhle
1	Frau H. S. 34 Jahre Hettstedt	1894	78	6	Pyosalpinx sinistra puerperalis. Tubo- ovarialabscess mit Durchbruch in die Flexura Sigmoides. Seit dem letzten Wochenbett Schmerzen im Leib, Eiter im Stuhl (in dems. Bact. coli und Staphylococci, letztere in Kulturen nicht aufgehend.	Salpingotomia sinistra. Bei der schwierigen Lösung des Eiter- sackes aus seinen Verwachsungen mit dem Uterus, Mesenter. coli, Dünn- darm und Lig. lat. platzt derselbe. Ausspülung mit Kochsalzlösung. Drainage d. Douglas, typischer Schlufs.	25.
2	Frau A. H. 27 Jahre Zeitz	1894	105	III	Tumor tuboovarial. dext. purulent. Salpingoophoritis sinistr. abcedens. Seit 1 Jahre starke Blutungen, seit 1 Monat Beschwerden im Leib und Kreuz. Beiderseits von der Mittellinie, im Ab- domen empfindl. Resistenzen.	Salpingoophorec- tomia dupl. Beide Tumoren platzen beim Versuch der Lösung; reich- licher Eiterergufs in die Bauchhöhle. Verschorfen der Stümpfe mit dem Paguelin. Spülen mit Kochsalzlösung. Drainage.	13.
3	Frau F. J. 38 Jahre Prüssendorf	1894	225	1	Salpingoophoritis dupl. Peritonitis circumscripta. (Seit 2 Jahren Meno- pause.)	Salpingoophorec- tomia duplex. Im kl. Becken zahl- reiche Eitercysten, welche platzen bei der Loslösung. Uterus wird soweit möglich, in den klaffenden Douglas eingenäht. Schlufs der Bauchwunde mit Drahtsuturen.	24.

abelle I

arotomien,
gen Eiterergusses
gewandt wurde.

Lauf nach der operation	Entlassen	Dauernd geheilt	†	Todesursache resp. Sektions- befund	Entlassungs- befund	Späteres Befinden resp. Bericht
wechselnd eige Temp- erigerungen. etion dauert zum 14. VI. n allmählich kürzt, am 11. Juni eggelassen.	23. VI.	ja			Im unteren Winkel der Bauchwunde eine 2 cm l. Fistel, nicht mehr secer- nierend. Allgemeinbe- finden und Kräftezustand gut.	Vorgestellt 26. VII. 97. Fistel geschlossen, in der Mitte der Bauch- narbe eine taubenei- grofse Hernie. Normaler Partus am 19. IV. 96. Keine Beschwerden.
bes Fieber um 17. VI., an Abfall. VI. Drain entfernt. etion gering inge Naht- weiterung erhalb der rainfistel. VI. aufge- standen.	1. VII.	ja			Entsprechend der Drainstelle eine bohnen- grofse, granu- lierende Fläche.	Bericht vom 23. VII. 97. Fistel 8 Wochen nach der Entlassung geschlossen. Keine Hernie. Regel nicht wiedergekehrt. Beschwerdenfrei.
schliche etion aus Drain und n Stich- kanälen. XI. Drain ntfernt.	21. IX	ja			Kleine, gut granulierende Fistel. Allgemeinbe- finden und Kräftezustand gut.	Bericht vom 16. VIII. 97. Fistel Dezemb. 95 geschlossen. Regel nicht wiedergekehrt. Bei starken An- strengungen eine kl. Hernie in der Mitte der Narbe, sonst keine Beschwerden.

Übersicht über bei denen die Drainage in die Bauchhöhle

Lfd. No.	Name, Alter, Wohnort	Jahr der Oper.	No. des Hauptbuches	Partus	Krankheit	Operation	De- de Op.
4	Frau M. H. 32 Jahre	1894	329	2 1 Abort (24. X. 94.)	Tuberculosis pulmonum, peritonei et genitalium. Seit dem Abort Fieber, Seitenstechen, aufgetriebener Leib. Vom 5. XII. Fieber auf 39,5° sich haltend.	Laparotomie. Nach Eröffnung des Peritoneums entleeren sich große Eitermengen, stammend aus einer durch verklebte Darmschlingen gebildeten Höhle, deren Boden vom Uterus und den vereiterten Adnexen gebildet wird.	18 XI
5	Frau A. R. 35 Jahre Bindorf bei Köthen	1895	332	7	Perioophoritis, retroflexio uteri fixata. Nach dem 6. Partus am 20. II. 85 bestehen Schmerzen im Leibe, Descensus vaginæ.	1) Salpingoophorectomia duplex. 2) Kolpoperineoplastik. Die l. Adnexe mit Darmschlingen fest verklebt. Bei Lösung der rechten Adnexe platzt ein Eiterherd zwischen Tube in Ovar. Annähen des Uterus mit 2 Drahtnähten an das Periost der Symphyse.	4. 23.
6	Frau M. B. 34 Jahre Schaafstedt	1895	343	2	Graviditas tubaria Pelveoperitonitis. Seit November 1894 Im l. Hypogastium eine dunkel fluktuierende, apfelgrosse Resistenz fühlbar.	Salpingoophorectomia sin. Bei mühsamer Lösung des mit Dünndarmschlingen verwachsenen Tubentumors platzt dieser, und es ergießt sich ein als Eiter imponierender Blutklumpen. Spülen mit Kochsalz-Lösung.	21.

abelle I

arotomien,
en Eiterergusses
ewandt wurde.

Verlauf nach der Operation	Entlassen	Dauernd geheilt	†	Todesursache resp. Sektions- befund	Entlassungs- befund	Späteres Befinden resp. Bericht
ke Sekretion, l. Verband- sel. 25. XII. nüttelfrost. tation der angen, be- nder Decubi- an den Tro- eren und am bein. 26. XII. egung einer nöffnung im las. 27. XII. er Schüttel- zunehmender fall, Abends thr Exitus.	17. II.	?	27. XII.	Tuberculosis maxime miliaris pleuræ, peritonei, pulmonum, uteri tubarum, renum Myocarditis parenchymotosa, Pleuritis ad- hæsiva duplex, Ödema pulmonum Hepar adiposum	Bauch- und Dammwunde fest geschlossen. Keinerlei Be- schwerden.	Pat. hat auf die briefliche Anfrage nach ihrem Be- finden nicht geantwortet.
nsige Tem- peratursteiger- en bis zum 17. I. plötzlicher durchbruch der ver- ten Drain- e, tägl. Ver- dwechsel. erlauf der moplastik gatt.	23. II.	nein			Bauchwunde klaubt 3 cm breit, Fistel 10 cm in die Tiefe führend.	Bei der Pat. ist am 18. V. 97 eine Aus- schabung des Uterus und des Fistelganges vor- genommen. Bei ihrer Entlassung am 25. VI. secerniert die Fistel immer noch stark.

Übersicht über bei denen die Drainage in die Bauchhöhle

Lfd. No.	Name, Alter, Wohnort	Jahr der Oper.	No. des Hauptbuches	Partus	Krankheit	Operation	De- de Op
7	Frau H. S. 51 Jahre Halle	1895	15	5	Kystadenoma ovar. sin. maligna purulent. Seit 3 Jahren Meno- pause. Seit Herbst d. J. Schmerzen im Kreuz und Druck nach unten.	Salpingoophorec- tomia duplex. Bei Loslösung des allseitig verwachse- nen ovariell. Tumors wird ein demselben angehöriger Abscess eröffnet. Gleich- zeitig entsteht ein Riss in dem nach rechts verlagerten Rectum, welcher mit starken Seiden- nähten geschlossen wird. Um das kl. Becken gegen die Bauchhöhle abzu- schließen, wird die Schede'sche Diaphragmabildung angewandt.	3. I
8	Frau M. Ö. 24 Jahre	1895	22	1	Pyosalpinx dext. Wegen eines Ovarial- tumors erschwerte Geburt am 14. XI. 94. Perforation des leben- den Kindes. Punktion des Tumors. 8 Tage Fieber. Tumor jetzt wieder gewachsen.	Salpingotomia dextra. Bei Punktion des Tumors entleert sich gelblich-grünlicher Eiter. Auswaschen der Abscesshöhle mit Solveollösung.	20.
9	Frau L. Sch. 45 Jahre Zeulenroda.	1895	45	0	Haematosalpinx dupl. Carcinoma tubae sin. inoperabil. Beginn des Leidens Mai 95. Krämpfe b. d. Menstruation. Schmerzen im Leib.	Salpingoophorec- tomia dupl. l. Tube platzt. die r. Tube einen Tumor m. dick. Wandungen bildend, wird in die Bauchwunde einge- näht, am 13. V. eröffnet und reichlich Carcinommassen entfernt.	9.

abelle I.

arotomien

en Eiterergusses

wandt wurde.

auf nach der eration	Entlassen	Dauernd geheilt	†	Todesursache resp. Sektions- befund	Entlassungs- befund	Späteres Befinden resp. Bericht
weise Er- n und Tem rsteigerung angehalten. Klysma von Willenthee ein Drain- eingebracht, zum grossen durch die ab. Wegen ander Wind- tung: 8. IV. gung eines praeternatu- auch jetzt noch kein und keine ab. Versuch. des fara- nen Stromes bewegung zu n, misslingt.			9. IV.	Peritonitis septica e. perfo- ratione Recti.		
berfreier erlauf.	19. V.	ja			Bauchwunde mit frischen Granu- lationen bedeckt. Allgemein- befinden gut.	Bericht v. 23. VII. 97: Wunde 7 Wochen nach Entlassung fest geschlossen. Regel wiedergekehrt, ohne Schmerzen. Normaler Partus im Okt. 1896.
Dauernd des Fieber; er Ausflufs er Vagina. I. aufge- anden.	24. VI.	?			2 cm lange Fistel im unteren Wundwinkel. Allgemein- befinden leidlich.	Bericht vom 23. VII: Pat. gestorben. Todesursache unbekannt.

Übersicht über bei denen die Drainage in die Bauchhöhle

Lfd. No.	Name, Alter, Wohnort	Jahr der Oper.	No. des Hauptbuches	Partus	Krankheit	Operation	De- d. Op.
10	Frau M. 47 Jahre Beesenlaublingen b. Alsleben	1895	148	2 3 Ab- orte	Kystadenoma malig. purulent. ovar. sin. (Beginn des Leidens April d. J.)	Ovariectomy sinistra. Tumor platzt bei der Lösung — Erguß reichlicher Eiter- menge. Darm an 2 Stellen verletzt ein 2 cm gr. Stück reseziert. Tumor in toto abgetragen.	30 V.
11	Frau H—s 29 Jahre Keuschberg	1895	193	2 1 Früh- geburt i. 7. Monat.	Pyosalpinx sinistra Haematosalpinx et salpingitis dextra.	Salpingoophorec- tomy sin. Salpingotomy dextra. (In dem aus dem geplatzten l. Tumor sich ergießenden Eiter sind Stäbchen.)	10.
12	Frau A. W. 46 Jahre Halle	1895	197	4 2 Ab- orte	Pyosalpinx dext.	Salpingoophorec- tomy dextra. Reichlicher Eiter- erguß aus einem Riß im Lig. lat. Tamponade- Drainage der Eiter- höhle u. d. Douglas.	15.
13	Frau A. R. — P. 33 Jahre Baalberge	1895	201	1	Tumor cysticus ovarii sin. Bei der Pat. wurde i. Januar 95 (angebl. wegen eines Ge- schwürs an der Gebärmutter) eine Ausschabung vor- genommen. Beginn des jetzigen Leidens Anfang Juni 95.	Ovariectomy sinistra. Bei der Loslösung des allseitig fest verwachsenen cystischen Tumors entleert sich ver- dächtigter Inhalt, Abtragung desselben. Tamponade- Drainage.	18.

abelle I

arotomien,
 en Eiterergusses
 ewandt wurde.

Verlauf nach der Operation	Entlassen	Dauernd geheilt	†	Todesursache resp. Sektions- befund	Entlassungs- befund	Späteres Befinden resp. Bericht
Temperatursteig. 5. VII. Sehr reichliche Sekretion 3. VIII. der Wunde vertheilt sich Kot. Haut sehr roth. Parotitis best. Allmäh- liche Besserung, geht durch Fistel ab, Haut erweicht.	25. IX.	?			Kotfistel. Im Douglas ein hühnereigroßes Recidiv. Subj. Beschwer- den gering.	Bericht 23. VII. 97. Pat. vor 1 Jahr gestorben. Todesursache nicht angegeben.
zum 15. X. r. Sekretion der Fi-stel lich. 17. X. in entfernt.	9. XI.	?			In der Bauch- wunde eine 6 cm tiefe Fistel, mäßig secer- nierend. Allge- meinbefinden gut.	Bericht 15. VIII. 97. Wunde noch offen, eitert. Mattigkeit, Schwere im Leibe. Pat. 2. X. 97 in die Klinik aufgenommen. Aus der Tiefe der Fistel einige Fäden ausgekr. Am 15. X. geh. entl.
Temperatur 30° starke Eitersekretion. 26. X. ne Wunde mit Ätzung feucht. Ver- heilte. Seit 24. XI. eiterfrei.	4. XII	ja			Wunde noch 6 cm lang, gut granulierend. Im unteren Teile ein kleiner flacher Trichter.	Bericht vom 25. VII. 97. Wunde Mitte Februar 97 ge- schlossen. Keine Hernie. Regel nicht mehr. Keine Beschwerden.
Temperatur Senkung des Eiterabflusses. Ein Drain ent- nach voraus- gehender all- gemeiner Kürzung selben. 6. XI. gestanden. dem Fistelse- werd. Staphy- lokokken z. T. auch Ketten gez.	13. XI.	?			Allgemeinbe- finden gut. Kleine. 6 cm tiefe Fistel im unteren Wund- winkel.	Bericht v. 18. VIII. 97. Pat. Septemb. 96 gestorben, Todes- ursache nicht bekannt.

Übersicht über bei denen die Drain in die Bauchhöhle

Lfd. No.	Name, Alter, Wohnort	Jahr der Oper.	No des Hauptbuches	Partus	Krankheit	Operation	D d Op
14	Frl. B. Sch. 21 Jahre Polleben	1895	206	1	Salpingitis duplex. Im Anschluß an einen Sturz Schmerzen i. d. l. Seite des Unterleibes. Weißer Ausfluß in mäßiger Menge.	Salpingotomia sin. Salpingoophorec- tomia dextra. Bei der Loslösung der r. Adnexe platzt ein Ovarialabsceß; im Eiter Staphylococcen.	23
15	Frau H. Fr. 46 Jahre Halle	1895	218	1	Haematosalpinx dupl. Letzter Partus 1869. Seit März 1894 Kreuzschmerzen, Drang nach unten, Vorfall.	Salpingoophorec- tomia dupl. Ventro- fixatio uteri. Riß in der Flexura Sigmoidea, aus dem Darminhalt ausge- treten.	2.
16	ledige E. R. 29 Jahre Halle	1895	275	1 2 Ab- orte	Tubo-ovarialabscess dexter. Seit d. l. Regel (Mitte September) Schmerzen, Er- brechen. 3. XII. Schüttelfrost. Ohn- macht.	Salpingoophorec- tomia dextra, salpingo- tomia sinistra. Bei Loslösung der stark verklebten r. Adnexe Eitererguß. l. Tube für sich entfernt. Paquelin- Drainage d. r. Douglas. (Im Tuben- eiter: Streptococcen, durch Kultur bestätigt.)	2. 1
17	Frau M. Th. 28 Jahre Wulffen	1896	345	2	Cystadenoma ovarii multiloculare. Seit 14 Tagen An- schwellung des Leibes. Fieber.	Salpingoophorec- tomia sin. Die Punktion der Cyste giebt stinken- den Eiter. (Streptococcen.)	10.

Tabelle I.
parotomien,
egen Eiterergusses
gewandt wurde.

Verlauf nach der Operation	Entlassen	Dauernd geheilt	†	Todesursache resp. Sektions- befund	Entlassungs- befund	Späteres Befinden resp. Bericht
Anfangs hohe Temperaturen starke Schmerzen. X. Nähte ent- femt; Wunde gut sehend. 2. XI. hinter dem Torus ein Exsudat sichtbar. Fistel sekernierend.	19. XI.	?			Fistel 6 cm lang, noch stark sekernierend. Subj. keine Be- schwerden.	Pat. ist am 23. VIII. 97 wieder in die Klinik aufgenommen wegen der noch bestehenden Fistel und nach Aus- schabung derselben geheilt entlassen.
Erbrechen. Schmerzen. Wind- haltungen. Seit XI. fieberfrei. XI. neuer An- stieg auf 39,1°. Fieber in der Seite. XI. Bei der Defäkation plötz- lich Athemnot, am 1. XI. nach 5 Minuten Exitus laetalis.			14. XI.	Embolie der r. Lungenarterie. Ödem beider Lungen Perito- nitis mit um- schrieben. Eiter- herd. Perfo- ration des Rectum.		
Sehr reichliche Exkretion aus der Fistel. Im Urin 10 % und 2 % Ei- weiss, sowie Glykose u. gekörnte Masse. 21. I. 96. Starkes Oedem der Beine. 12. II. 96. Wunde herausge- zogen, schwer zu versorgen. Führen.	19. II. 1896		14. III. 1896	Nephritis et Peri- tonitis chronica, eitrige Pleuritis l. Hydrothorax. Fettleber. Ab- scesse zwischen Leber u. Zwerg- fell, u. zwischen Cöcum u. Bauch- wand. Beginnende hämorrhagische Pachymeningi- tis, Gehirn- anämie.	Fistel noch stark sekernierend. Im Urin Eiweiss. Über dem rechten Scheidengewölbe eine grosse Resi- stenz. Pat. wird der Med. Klinik zur weiteren Be- handlung über- wiesen, dort am 14. III. gestorben.	
Leber bis zum Nabel. Starke Exkretion. All- gemeine Kürzung d. Harns. Einige Harnabscesse. Schwankel am Kreuzbein.	15. IV.	?			Bauchdecken- narbe fest. Rechts eine Resistenz bis zur Lebergrenze, Bauchdecken darüber ver- schieblich.	Pat. hat auf brief- liche Anfrage nach ihrem Befinden nicht geantwortet.

Übersichts

über 3
bei denen die Drainage
in die Bauchhöhle

Lfd. No.	Name, Alter, Wohnort	Jahr der Oper.	No. des Hauptbuche	Partus	Krankheit	Operation	Dat. der Oper.
18	Fräulein M. 20 Jahre. (Priv.)	1896	29	0	Vereitertes Kystoma- ovarii multiloculare. Pat. machte im April 1895 eine Unterleibs- entzündung durch.	Ovariectomie. Die Cyste platzte, im Eiter keine Bakterien, Paquelin- Spülung mit Salz- wasser.	25. I.
19	Frau M. 22 Jahre. (Hochheim.)	1896	67	1	Tumor tuboovari- sin., Pyosalpinx dext.	Salpingo-oophorec- tomy sin. Salpingo- tomy dextra. (Im Tubeneiter keine Bakterien zu züchten durch Kultur.	18. I.
20	Frau Cl. 31 Jahre. (Priv.)	1896	52	1	Tumor tuboovari- sin. duplex. Beschwerden seit dem Partus im Jahre 1886.	Salpingo-oophorec- tomy dupl. Beide Eiertercysten platzten bei der Lösung, erhebl. Blutung.	22. VII.
21	Frau A. T. 34 Jahre. Wengelsdorf.	1896	80	2	Pyosalpinx sin. Salpingitis dextra. Seit 1 Jahre Vorfall;	Salpingo-oophorec- tomy sin. Salpingo- tomy dextra. Im Tubeneiter spärliche Bacillen, keine Coccen.	
22	Frau B. R. 36 Jahre. Schraplau.	1896	128	8	Puerperaler Tubova- rialabscess sin. Seit dem letzten Partus 10. IV. 96, starke Schmerzen im Leib.	Salpingotomy sin. Darm und Blase so stark verwachsen, dass der Schnitt in der linea alba eine Freilegung der Adnexe nicht zulässt. Neuer Schnitt seit- lich von der Mittel- linie. Ausspülung des eitrigen Tuba- sackes mit Sublimat.	11. V.

Tabelle I.

parotomien,
gegen Eiterergusses
gewandt wurde.

Verlauf nach der Operation	Entlassen	Dauernd geheilt	†	Todesursache resp. Sektions- befund	Entlassungs- befund.	Späteres Befinden resp. Bericht
weisse mäßige Temperatur- steigerung.	20. VI.	?			Fistel noch secernierend.	Bericht. Fistel zeit- weise geschlossen, dann wieder auf und gering secer- nierend.
Wiederholt hohe Temperaturen. Bronchitis, schleimige Sekre- te aus der Fistel. 23. VIII. Eiter im Exsudat. Erhöhte Temper- atur.	3. IX.	nein			Bauchwunde ge- schlossen. In der l. Unterbauch- gegend eine grosse Resistenz. Im r. Parametrium er- hebliche Exsudat- reste.	Bericht 20. VII. 97. Wunde geschlossen. Keine Hernie. Regel 1/2 Jahr p. Op. wiederge- kehrt mit Schmerzen. Geschwulst auf d. r. Seite des Leibes, eitr Ausfluss.
Geringe Excretion aus der Fistel, Ende Juli aufgehört.	19. VIII.	ja			Fistel noch 3 cm tief, nicht mehr secernierend. Kein Exsudat.	Bericht 18. X. 97. Schon seit Ende Juli a. d. Fistel keine Ab- sonder. mehr. Jetzt eine kl. Hernie a. d. tiefst. Stelle d. Narbe.
Wunde bis 22. VI. Eiter reichlich. Excretion, am 21. I. aufgehört. Drain heraus- gefallen.	22. VII.	ja			Bauchwunde gut geschlossen. Vom Rectum aus im l. Parametrium eine mässig schmerz- hafte Resistenz zu fühlen.	Vorgest. 22. VII. 97. Narbe fest, keine Hernie, kein Exsudat. Regel am 30. VIII. wiedergekommen. Beschwerdenfrei.
Wunde in der Haut alba am 21. VI. glatt geheilt. Drain- wunde anfangs entzündet; Excretion mässig stark.	9. VII.	ja			Wunde bis auf die Drainstelle geschlossen. Fistel (2 1/2 cm tief) gut granu- lierend. Mässig weisser Fluor.	Vorgest. 22. VII. 97. Fistel geschlossen, Regel wiederge- kehrt, keine Hernie, keine Beschwerden.

Übersichts

über 3
bei denen die Drainag
in die Bauchhöhle

Lfd. No.	Name, Alter, Wohnort	Jahr der Oper.	No. des Hauptbuches	Partus	Krankheit	Operation	Dat der Oper
23	Frau K. 36 Jahre Neust.-Magdeb.	1896	139	1	Tuboovarialabscess dupl.	Salpingotomia dupl. 1. Tumor, mit dem Darm innig ver- wachsen, platzt — fäkulenter Eiter — bakter. Untersuch. desselben negativ.	1. VIII
24	Frau V. 53 Jahre Naumburg.	1896	176	8	Tumor ovar. dext. papillomatos. Descensus vaginae ant. et post.	Ovariectomy dupl. Amputatio uteri supravaginal m. extraperitonealer Stielversorgung. Kolpoperineoplastik. Eiterentleerung aus 1. Cyste.	1. X
25	Ledige W. 27 Jahre Könnern.	1896	198	0	Pyosalpinx sin. Salpingitis et oopho- ritis dext. 1890 Geschwür an den Genitalien — Ausfluß. Schmier- kur (Lues). Beginn d. jetz. Leidens am 1. Oktober 96.	Salpingotomia sinistra. Salpingoophorec- tomia dextra. Pyosalpinx ist fest mit der Umgebung verlötet, platzt bei der Loslösung.	15. X
26	Frau B. 38 Jahre Nordheim.	1896	203	0	Pyosalpinx dupl. Abscessus ovarii sinistri. Metritis. Parametritis, Cystitis b. Pat. 1895 eine Ausschabung ge- macht worden (wo?). Im Juni 96 Er- öffnung eines Eiter- herdes unter dem Poupartischen Bande, jetzt noch secernierend.	Salpingoophorec- tomia dupl. Extirpatio uteri total abdominal. Im Eiter des bei der Oper. geplatzten Pyosalpinx. — kurze Stäbchen.	19. X

Tabelle I.

Parotomien,
 Eiterergusses
 bewandt wurde.

Verlauf nach der Operation	Entlassen	Dauernd geheilt	†	Todesursache resp. Sektions- befund	Entlassungs- befund	Späteres Befinden resp. Bericht
1. Eitrige Erbrechen. 2. reichl. Se- 3. tion. Durch- 4. en der Wunde 5. 3 0/0 Karbol- 6. ung. 28. XIII. 7. ein entfernt.	9. IX.	ja			Bauchwunde bis auf eine kl. gut granulierende Stelle verheilt. Im l. Parametrium mässiges Exsudat. Allgemeinbefinden und Kräftezustand gut.	Bericht v. 22. VII. 97: Wunde bald nach Entlassung ge- schlossen. Keine Hernie. Keine Be- schwerden. Arbeits- fähig.
1. Urin an- 2. halten. Wund- 3.ichter um den 4. mpf d. Uterus 5. x secernierend. 6. . Abschneiden 7. s Stumpfes. 8. aufgestanden 9. . Dammnähte 10. entfernt.	9. IX.	nein			Kleine Granu- lationswunde im u. Wundwinkel. Dammwunde per primam geheilt. Allgemein- befinden gut.	Bericht v. 19. VII. 97: Bauchwunde ge- schlossen. Seit Febr. 97 eine Hernie — jetzt faustgroß. Nachts schleimiges Erbrechen. Urin- u. Stuhlbeschwerden.
1. den ersten 2. gen Fieber. 3. etion mäßig. 4. . X. Drain 5. ert. 28. X. 6. fgestanden.	1. XI.	ja			Im u. Wund- winkel kleine Fistel, 1 1/2 cm tief. L. v. Uterus ein mäßig großes Stumpf-Exsudat. Allgemein- befinden gut.	Vorge stellt 29. VII. 97: Fistel geschlossen. Keine Hernie. Regel wiedergekehrt. Etwas Schmerzen bei der Stuhlentleerung.
1. ber. Abgang 2. ebelriechen- 3. Sekretes aus 4. der Scheide. 5. chwnnde in 6. ganzen Aus- 7. ung vereitert, 8. atung derselb. 9. . Allmähliche 10. eschlimmerung 11. Erscheinung. 12. onders der 13. etitis. Hallu- 14. tionen. Anfälle 15. n Tobsucht, 16. umende Herz- 17. schwäche.			8. XII.	Herzschwäche Lungen-Ödem (Sektion ver- weigert).		

Übersichts

über 3
bei denen die Drainage
in die Bauchhöhle

Lfd. No.	Name, Alter, Wohnort.	Jahr der Oper.	No. des Hauptbuches	Partus	Krankheit	Operation	Dat. der Oper.
27	Frau M. B. 37 Jahre. (Priv.)	1896	71	1	Endometritis (eitrig). Pyosalpinx sin. Wegen jauchigen Ausflusses am 3. X. eine Ausschabung, darauf peritonitische Symptome, die sich verschlimmern.	Salpingotomia sin. Eröffnung eines ab- gesackten Eiter- herdes zwischen Darm und Netz. Im Tubeneiter Staphylococcen und Streptococcen. Spülung mit Koch- salz-Lösung.	12. X
28	Frau P. R. 39 Jahre. Halle.	1896	225	4 1 Ab- ort.	Myomata uteri Pyosal- pinx dupl. Tumor parovarial sin.	Salpingoophorec- tomia dupl. Amputatio uteri supravaginalis (mit extraperito- nealer Stielver- sorgung.) Beide Tubensäcke platzen.	18. XII
29	Frau D. 36 Jahre. Mehringen.	1896	229	0	Tumor tuboovarialis dupl. Parametritis exsudativa. Seit 15 Jahren steril verheir. Seit 1 Jahr wehenart Schmerzen in d. linken Seite.	Salpingoophorec- tomia duplex. Erguß einer großen Eitermenge aus den bei der Lösung platzenden Tuben- tumoren.	16. XI.
30	Frau W. M. 50 Jahre. Hornhausen.	1896	225	5	Pericolitischer Abscess. 17 XII. durch Punktion 80 ccm Eiter entleert.	Incision parallel dem Lig. Poupart. Ein Riß im Peri- toneum läßt die Därme hervor- treten, unterhalb desselben quillt Eiter hervor. Beim tieferen Eindringen in die Abscesshöhle zeigt sich eine Ver- bindung dieser mit der Vagina. Im Eiter Diplococcen. Kultur negativ.	19. XII

Tabelle I.

Carotomien,
 gegen Eiterergusses
 angewandt wurde.

Verlauf nach der Operation	Entlassen	Dauernd geheilt	†	Todesursache resp. Sektions- befund	Entlassungs- befund	Späteres Befinden resp. Bericht
XI. Starke Schmerzen. über 39,5 °. 142. Eis- se. — Pat. Ist Abends in unter sich gehen.			24. XI.	Septicopyämie. (Sektion ver- weigert.)		
siges Fieber. XII. Drain ggelassen. Stumpf ent- fernt. I. 97. auf- gestanden.	4. II. 1897.	ja			Bauchwunde bis auf eine 3 cm l. Fistel geheilt. Mässiges Exsudat hinter dem Uterus. Subjektiv keine Beschwerd.	Vorgestellt 26. VII. 97. Fistel geschl. Keine Hernie. Regel nicht mehr. Keine Be- schwerden, arbeitsfähig.
Tage p. Op. 38,5 ° 24. XI. Einung eines nachdecken- ses. 3. XII. n entfernt. e mit Chlor- geätzt. 8. XII. gestanden.	13. XII. 1897.	ja			Bauchwunde bis auf eine kl. Fläche entspr. der Drain- stelle geheilt. In beid. Parametrien Resistenzen. Keine Be- schwerden.	Vorgestellt 26. VII. 97. Wunde 6 Woch. nach Entl. geschl. Regel nicht mehr. Keine Beschwerd. ausser bei grossen Anstrengungen
rection sehr und übel- nend, tägl. al Verband- nsel. Urin hält reichl. Salol. 2. X. prodie. 5. I. Incision es Becken- ses. 15. I. de mit der gina nicht hr durch- gängig.	27. II. 1897.	ja			Incisionswunde bis auf eine 3 cm l., 1/2 cm br., gutgranulierende Stelle verheilt. Allgemein- befinden gut.	Vorgestellt 28. VII. 97. Wunde 14 Tage nach Entlass. geschl. Beginnende kl. Hernie im unteren Wund- winkel. Keine Beschwerden.

Übersichts

über
bei denen die Drainage
in die Bauchhöhle

Lfd. No	Name, Alter, Wohnort	Jahr der Oper.	No. des Hauptbuches	Partus	Krankheit	Operation	Da de Ope
31	Frau Wwe. S. 39 Jahre	1897	274	2 1 Ab- ort	Pyosalpinx dupl. Parametritis. (Gonococcen.)	Salpingoophorec- tomia duplex. Beide Eitersäcke platzen. Im Eiter Bacter. coli commune.	12.
32	Frau M. Kl- 26 Jahre Artern	1897	294	3	Pyosalpinx sin. Residua parametr. sin. Im Anschluß an das letzte Wochen- bett Novemb. 1895 Fieber, seither bettl. Seit April 1896 eitrig. Ausfluß.	Salpingotomia sin. (zweizeitig). Ein- nähen des Eiter- sackes in die Bauchhöhle. Eröffnung desselben. Kulturen des Eiters negativ.	20. 22.
33	Frau Th. M- 33 Jahre Pasewitz	1897	360	7	Intraperitonealer Abscess. Pyosalpinx duplex. (?)	Laparotomie zur Sicherung der Diagnose. Eröffnung einer abgesackten Höhle, der schäumende Gas- mengen ent- strömen, zweifelhaft ob Darm oder vereiterte Tube vorliegt. Mit Rück- sicht auf d. schlechte Verfassung der Pat. wird von weiterem Vorgehen Abstand genommen.	30. I
34	Frau J. P. 40 Jahre Iwershausen	1897	82	2 2 Ab- orte 2 to- ge- boren	Pyosalpinx dupl. am 2. VI. mit hohem Fieber u. Erbrechen aufgenommen, wegen Indicatio vitalis operiert.	Salpingoophorec- tomia duplex. Reichlicher Eiter- erguß aus den ge- platzten Cysten. Spülung. Tamponade. Drainage.	2. V

abelle I

arotomien,
 en Eiterergusses
 ewandt wurde.

Verlauf nach der Operation	Entlassen	Dauernd geheilt	Todesursache resp. Sektions- befund	Entlassungs- befund	Späteres Befinden resp. Bericht
Bauchwunde z. der reich- en Sekretion der Drain- gutheilend Drain entf aufgestand.	2 II.	ja		Bauchwunde bis auf eine kleine Stelle ge- schlossen. Fistel 2 cm tief. Im l. Parametrium Exsudat-Reste.	Vorgest. 25. VII. 97. Fistel geschlossen. Keine Hernie. Ab- und zu geringe Schmerzen im Kreuz. Arbeitsfähig.
in starker Se- ktion täglich andwechsel. rain entfernt. aufgestau- te Sekretion und mehr nehmend.	14. II.	ja		Sonde geht noch 6 cm tief in den Tubensack. Se- kretion schleimig eitrig. Kräftezu- stand erh. gebess. D. Beh. d. Kassen- arztes übergeben.	Bericht vom 25. VII. 97. Fistel nach 6 Wochen geschlossen. Keine Hernie. Regel wiederge- kehrt, rglm. ohne Schmerzen. Arbeitsfähig.
ektion aufser- entlich stark fäculant. end. Zustand verschlechte- te. Hohe Tem- peraturen. 3. IV. dem der ae. 8. IV. r rapidem everfall und hgradiger spnoë tritt itus ein.			8. IV. Multiple Ovarial- abscesse, Perfo- ration i. die Bauch- höhle. Peritonitis chronica. Perihepatitis Perisplenitis Endometritis Bronchopneumoni- sche Herde in beiden Unterlappen; braune Atrophie des Herzens.		
ngs anschei- Besserung. M. Windver- ag. 4. Tampon Unter zun. mot u. d. Er- n d. allgem. eritonitis WI. Exitus.			5. VI Pleuritis adhaesiva. In der r. Lungenspitze eine mit stin- kendem Eiter ge- füllte Caverne. Im Mittellappen zahlr. Tuberkel. Peritonitis.		

Übersicht über bei denen die Drainage angewandt

Lfd. No.	Name, Alter, Wohnort	Jahr der Oper.	No. des Hauptbuches	Partus	Krankheit	Operation	Da- de Op.
1	Frau E. W. 42 Jahre (Priv.)	1894		0	Sarcoma ovar. dextr. Pat. erlitt im April einen Sturz, seither Schmerzen im Unterleib. Im Ab- domen knollige Tumoren fühlbar.	Oophorectomia dupl.	23 VI
2	Frau M. N. 33 Jahre (Priv.)	1895	19	0	Intraligamentäres Myom d. Uterus. Seit December 94 kolikart. Schmerzen im Leibe u. Kreuz. Am Herz. anämische Geräusche. R. vom Uterus, mit ihm in breiter Verbindung, ein kindskopfgroßer, sehr druckempfind- licher Tumor.	Salpingoophorec- tomia dupl. Schwierige Lösung der zwischen Netz u. Unterleibsorganen bestehenden Ver- klebungen. Bei Lösung d. Tumors heftige parenchyma- töse Blutung.	5. I
3	Frau H. 43 Jahre Maasdorf bei Liebenwerda.	1895	47	I. Wochenb. Fieberh.	Kystadenoma ovar. dextr. Seit 2 Jahren Schmerzen im Leib, rotbrauner, übel- riechender Ausfluß. Nach Punktion des Ascites (2 $\frac{1}{2}$ l.) ein Tumor fühlbar.	Ovariectomy dextra. Amputatio uteri supra- vaginalis (mit extra- peritonealer Stiel- versorgung); starke Blutung aus dem angerissenen Lig. lat.	7.
4	Fräul. E. 18 Jahre Sitzsch.	1896	119	0	Graviditas tubaria. Unauss gesetzte Blutungen seit der letzten Regel am 8. VIII.	Salpingoophorec- tomia sinistra. Vernähen der Parie- talserosa der vorderen Bauchwand mit der serosa des starrwandigen S. Romanum.	26. VII

abelle II.

arotomien,
en Blutung
de.

Verlauf nach der Operation	Entlassen	Dauernd geheilt	†	Todesursache resp. Sektions- befund	Entlassungs- befund	Späteres Befinden resp. Bericht
ig fieberhaft.			27. VII.	Lungen-Embolie.		
ch dem Er- nen aus der rose zeigt sich Parese des Armes. iges Fieber um 13. IV. in entfernt; 15. IV. Ataxie thezu ge- chwunden.	16. IV.	ja			Bauchwunde bis auf eine kleine, gut granulierende Stelle verheilt. Allgemein- befinden sehr gut.	Bericht v. 17. X. 97: Fistel seit Jnni 1895, wo einige Fäden ausgeschabt wurden, geschlossen. Wohl- befinden.
wechselnd ge Tempe- ratursteiger- en bis zum V., dann Al fall.	21. VI.	nein			Keine subjektiv. Beschwerden; kein Exsudat. Trichter gut granulierend.	Bericht: Bauchwunde hatte sich 14 Tage nach Entlassung geschlossen. Pat. ist am 18. II. 97 (angeblich) an einem Recidiv gestorben.
September Entleerung der Wunde pigm. Seit kein Kot- gang mehr. 18. aufge- standen.	21. IX.	ja			Bauchwunde bis auf eine 2 cm l. gut granulierende Stelle, ohne Fistel, geheilt. Im l. Douglas festes Exsudat.	Persönlich vorgestellt 20. VII. 97. Narbe fest, keine Hernie Drainag. Wunde strahlig verdickt. Uterus klein, antefl., bewegl. Regel wiedergekehrt.

Übersicht

über

bei denen die Drainage

angewandt

Lfd. No.	Name, Alter, Wohnort	Jahr der Oper.	No. des Hauptbuches	Partus	Krankheit	Operation	D d Op
5	Frau R. 37 Jahre. Halle.	1896	157	2	Haematosalpinx dext. Seit 8. VIII. Blutungen, Kreuz- schmerzen, Ohn- macht.	Salpingo-oophorec- tomia dupl. Schwierige Lösung des besonders im Douglas und an der hinteren Beckenwand stark verwachsenen rechten Tubensackes und des mit ihm verlöteten Ovar.	3.
6	Frau Cl. R. 36 Jahre. Erfurt.	1897	318	0	Kystoma ovarii dextr. (unilocular). Beginn des Leidens Januar 1896. Schmerzen bei der Periode.	Oophorectomia dupl. Bei Eröffnung des Peritoneums wird eine Dünndarm- schlinge verletzt, und der Riss durch Katgutnähte ge- schlossen.	8
7	Frau S. 46 Jahre. (Priv.)	1897	21	0	Hydrosalpinx dupl. Pat. hat im Alter von 22 Jahren eine Perityphlitis durch- gemacht. Als junge Frau ist sie in Jena wegen einer linksseitigen Eier- stocksgeschwulst operiert worden. Pat. seit 21 Jahr. steril verheiratet. Seit Aug. 96 Geschwulst in der r. Seite, schmerzhaft, in der letzten Zeit schnell gewachsen.	Salpingotomia dupl. Beide Säcke platzen bei der Loslösung infolge eines Risses in der l. Platte des Lig. lat. starke Blutung; daher Tamponade- Drainage.	8.

Tabelle II.

Parotomien,
gegen Blutung
wurde.

Verlauf nach der Operation	Entlassen	Dauernd geheilt	†	Todesursache resp. Sektions- befund.	Entlassungs- befund	Späteres Befinden resp. Bericht
zen stark blut. urchtränkung es Verbandes, agl. Verband- chsehl. Stuhl- eschwerden, auchdecken- scsess. 16. IX. Kotbrechen, welches auf agenspülung hwindet. 4. X. ain und Nähte ernt. 6. X. auf- gestanden.	9. X.	ja			Bauchwunde bis auf eine kleine, gut granulierende Stelle geschloss. Uterus durch ein ziemlich ausge- dehntes Exsudat dextrovertiert. Subj. keine Be- schwerden.	Vorgestellt 10. VIII. 97. Narbe fest. Keine Hernie, keine Be- schwerden.
ältsige Tem- peratursteiger- en am Abend Oper. 13. II. ain entfernt. aler. 7. II. ufgestanden.	14. III.	ja			Kl. gut granu- lierende Stelle entspr. dem Sitze des Drains. Im Douglas ein mäßiges Exsu- dat. Allgemein- befinden gut.	Bericht 22. VII. 97. Wunde 14 Tage n. Entlassung geschl., keine Hernie. Regel noch nicht wieder. Zeitweise etwas Schmerzen im Rücken und etwas weisser Ausfluss.
ieberfreier auf. Drain- stel mälsig eiternd. IV. aufge- standen.	17. IV.	nein			Drainfistel noch 10 cm tief, mälsig eiternd. Rechts vom Uterus ein nicht empfindliches Exsudat.	Bericht 21. X. 97. Es besteht noch eine eiternde Fistel von 8 cm Länge, sonst Wohlbefinden.

Diese 41 Fälle stellen nur einen Bruchteil = 14,3 % aller Laparotomien dar, die von Herrn Prof. Dr. Fehling in der Zeit vom April 1894 bis Juli 1897 ausgeführt wurden, und sind, wie aus den Krankenberichten bezw. Operationsberichten hervorgehen dürfte, die schwersten Fälle mit den unangenehmsten und gefährlichsten Komplikationen.

Es entfielen von 287 Laparotomien 42 auf Kastrationen wegen Myomen. Unter den 245 anderen sind Ovariectomien Salpingo-oophorectomien, ferner Laparotomien wegen Ruptura uteri Sectio Cäsaria, Intraperitonealabscessen u. s. w.

Zur Kenntnisnahme der Erfolge unserer 41 Fälle möge folgende Zusammenstellung dienen:

	†	Dauernd geheilt	?	Nicht geheilt
Von den wegen Eiter drain.	8	15	8	3
„ „ „ Blutung „	1	4		2
	9	19	8	5
	21,9 %	46,4 %	19,5 %	12,2 %

Sehen wir uns nun zunächst die Todesfälle näher an, so finden wir unter ihnen: 2 Lungenembolien Tab. I No. 15, Tab. II No. 1, 2 Miliartuberkulosen Tab. I No. 4 und No. 34.

Dafs diese 4 Todesfälle unmöglich der Drainage zur Last gelegt werden können, ist wohl selbstverständlich.

Ebenso darf wohl auch der Todesfall No. 16, Tab. I, wo den Exitus eine chronische Nephritis bedingte, wegen der die Patientin nahezu einen Monat in der Med. Klinik behandelt wurde, als nicht mit der Drainage in Zusammenhang stehend bezeichnet werden.

Fall 26, Tab. I, hatte schon eine eiternde Fistel und kam schwer krank zur Operation.

Fall 7, Tab. I, betraf eine Peritonitis septica e. perforatione Recti.

Fall 27 eine Septicopyaemie (im Tubeneiter Staphylococcen und Streptococcen).

Fall 33, Tab. I, Multiple Ovarialabscesse mit Durchbruch in die Bauchhöhle.

Man muß sich angesichts dieser Todesursachen doch unwillkürlich die Frage vorlegen: „Was würde aus diesen Fällen geworden sein, wenn nicht drainiert, sondern primär vernäht worden wäre?“ Würde die primäre Naht einer Peritonitis septica e. perforatione Recti haben vorbeugen oder würde sie den Staphylococcen und Streptococcen in Fall 27 ihre Virulenz haben benehmen können? Diese Frage muß sicherlich verneint werden.

Unter die als „zweifelhaft“ bezeichneten Fälle sind 1) diejenigen gerechnet, welche auf briefliche Anfrage nach ihrem Befinden nicht geantwortet hatten, 2) diejenigen, die erst in jüngster Zeit entlassen wurden und bei denen noch irgend welche Beschwerden bestanden, 3) auch diejenigen, die nach eingezogener Ermittlung zu Hause gestorben, und deren Todesursache unbekannt war.

Als „nicht geheilt“ sind diejenigen Fälle bezeichnet, bei denen nach langer Zeit noch eine eiternde Fistel besteht.

Hernien sind unter den 41 Fällen 5 aufgetreten = 12,2 %. Aus dieser Zahl könnte man vielleicht einen Vorwurf gegen die Drainage ableiten insofern, als der Sitz des Drains später im Peritoneum einen locus minoris resistentiae schaffte. Dann müßte natürlich die Hernie auch an der Drainstelle auftreten und das ist allerdings 2mal geschehen. Es wird das Auftreten der Hernien wohl mehr auf Kosten der Eiterung, als auf Kosten der Drainage gehen, obgleich die Dauer der Eiterung mit der Anzahl der sich bildenden Hernien keineswegs im geraden Verhältnis zu wachsen scheint.

Das wichtigste Moment hierbei giebt sicherlich das Peritoneum selbst ab, seine Resistenz und seine Regenerationsfähigkeit.

Letztere namentlich wird auch für die Heilungsdauer,

d. h. bis zum Schluß der Fistel von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein, obgleich in dieser Beziehung ein Nachteil der Drainage wohl nicht geleugnet werden kann.

Es ist verständlich, daß die Drainage, auch wenn sie an sich nur einen mäßigen Reiz auf das Peritoneum ausübt, dennoch letzteres an der Drainstelle für längere Zeit am Zusammenwachsen hindern muß.

Trotzdem zeigen sich in der bis zum definitiven Schluß des Peritoneums verstreichenden Frist so außerordentlich große Schwankungen, daß man nicht einmal annähernd genau die mittlere Heilungsdauer angeben kann. In dem einen Falle schließt sich die Fistel schon nach 14 Tagen, in dem zweiten, *ceteris paribus*, erst in 4 Wochen, in dem dritten erst nach 8 Wochen und noch später, sodaß, wie es in 4 unserer Fälle geschehen, erst eine Nachoperation die Fistel zum Schlusse bringt. Weshalb nun unter sonst gleichen Bedingungen der Schluß der Fistel zeitlich so verschieden erfolgt, dafür möchten wir eine Erklärung in der Annahme suchen, daß das Peritoneum der einzelnen Individuen, mit Rücksicht auf die Fähigkeit, zusammengewachsen, außerordentlich verschiedenartig ist.

Vergleichen wir nun die Resultate unserer 41 Fälle mit denen anderer Operateure, welche aus gleicher Indication die Drainage verwenden, so zeigt sich besonders bezüglich der Zahl der „dauernden“ Heilungen eine gewisse Übereinstimmung.

Schauta (s. Wiener Frauenklinik) hat in seinen auf dem Gynäkologen-Kongress 1893 veröffentlichten 216 Fällen von Adnex-Operationen 22 mal drainiert und seine Resultate sind folgende:

	†	Dauernd geheilt	?	Nicht geheilt
In den wegen Eiter drain.	4	6	7	2
„ „ Blutung „	.	3		
	4	9	7	2
	18,2 %	40,9 %	31,5 %	9,1 %

Günstiger noch sind die Erfolge aus der Klinik des Herrn Prof. Dr. Küstner (Breslau). In einer Dissertation (Kern) hat er kürzlich 159 Fälle von Adnexoperationen veröffentlichten lassen, von denen 43 drainiert worden sind, und zwar wegen Eiterergusses 41 mal, wegen Blutung 2 mal. Seine Resultate sind diese:

†	Dauernd geheilt	?	Nicht geheilt
2	24	12	5
4,6 %	56,8 %	27,5 %	11,6 %

Fassen wir nun die uns zu Gebote stehenden Resultate aller drei Operateure zusammen, so bekommen wir im ganzen 106 Fälle. Von diesen sind

	†	Dauernd geheilt	?	Nicht geheilt
106	15	52	27	12
	14,1 %	49,1 %	25,5 %	11,3 %

Wenn man nun angesichts dieser Zahlen noch berücksichtigt, daß die Mortalitätsziffer von 14,1 % wesentlich durch die unglücklichen Todesfälle unserer eigenen Statistik wie Embolien, Miliartuberkulosen etc. hochgeschraubt, daß ferner der hohe Prozentsatz der fraglichen Fälle hauptsächlich durch den Ausfall der Berichte über späteres Befinden in der Statistik Schautas bedingt ist, so wird man aus diesen Endresultaten gewiß kein belastendes Moment gegen die Drainage ableiten können.

Doch bevor wir zum Schlusse kommen, müssen wir noch eines Verfahrens gedenken, welches den Zweck ver-

folgt, die Drainage durch eine neue Operationsmethode überflüssig zu machen, nämlich der von Schede in Vorschlag gebrachten Methode der künstlichen Diaphragmabildung.

Sie besteht im wesentlichen in dem Bestreben, durch operativen Eingriff einen Abschlufs des grossen Beckens vom kleinen Becken zu bewerkstelligen.

Zu diesem Ende vernäht Schede das Peritoneum parietale der Linea innominata zugleich mit den unter sich vereinigten Därmen an das Peritoneum parietale der Bauchwand an.

Dafs es hierbei zur gewaltsamen Zerrung aller in Frage kommenden Organe, besonders zu Knickungen des Darmes mit allen Folgeerscheinungen leicht kommen kann, das beweist u. a. auch ein Fall in unserer Statistik, der einzige, bei dem diese Methode in Anwendung kam, Fall 26, Tab. I. Der Fall endete laetal, und ein Blick auf den Verlauf nach der Operation läfst erkennen, wie unangenehm sich die Verhältnisse gestalteten. Die Resultate Schedes bei Anwendung dieser Methode sind, Todesfälle 22,2 %, dauernd geheilt 45,8 %, fraglich 25 %, nicht geheilt 8,3 %.

Fassen wir nun alles das, was über die Drainage gesagt wurde, zusammen, so erscheint sie uns keineswegs in so düsterem Lichte, wie die Gegner derselben sie zu schildern pflegen. Bei der Beurteilung der unter ihrer Anwendung erzielten Resultate mufs vor allen Dingen die Rücksicht auf die Schwere jener Fälle walten, die sie erheischte.

Die Einwendungen und Bedenken gegen sie sind zum grossen Teile unberechtigt, und stehen nicht im Einklang mit den durch sie erzielten Erfolgen.

Zum Schlusse dankt Verfasser seinem hochverehrten
Lehrer, Herrn Geheimrat Prof. Dr. Fehling für die gütige
Überlassung des Materials und für die stetigen Unterstützungen
bei Anfertigung der Arbeit.

Lebenslauf.

Am 3. April 1872 wurde ich als Sohn des Mühlenbesitzers Philipp Huschenbett zu Heiligenstadt (Eichsfeld) geboren. Michaelis 1882 wurde ich Schüler des Königlichen Gymnasiums meiner Vaterstadt, woselbst ich Michaelis 1893 das Zeugnis der Reife erlangte.

Ich widmete mich dem Studium der Medizin und besuchte die Universitäten Berlin, Greifswald, Würzburg, München und Halle.

Während meines zweiten Semesters genügte ich meiner Militärpflicht mit der Waffe in Greifswald beim Inf.-Rgt. Prinz Moritz von Anhalt-Dessau (5. Pommersches) No. 42.

Meine Lehrer auf den verschiedenen Universitäten waren:

In Berlin: Waldeyer, Fischer.

In Greifswald: Ballowitz.

In Würzburg: von Kölliker, Fick, Röntgen
Hantsch, Boveri.

In München: Bauer, Bollinger, Tappeiner,
v. Winkel, Moritz,

In Halle: v. Bramann, Weber, Fehling, Fränkel,
v. Hippel, Eberth, Harnack, Hitzig,
v. Mering, Pott.

Litteratur.

- Schauta. Referat über Indikationen, Technik und die Erfolge der Adnex-Operationen. (Verhandl. der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie IV.)
- Göbel. Über den Abschluß septischer Höhlen bei Köcliotomien, speciell bei Operationen im kleinen Becken.
- Gemp. (Inaugural-Dissertation.) Über die Indikationen zur Drainage der Bauchhöhle nach Laparotomien.
- Kern. (Inaug.-Dissertation.) Beitrag zur operativen Behandlung der entzündlichen Adnexoperationen.
- Cossmann. (Inaug. - Dissertat.) Bakteriologische Untersuchungen über die Virulenz und Infektiosität des Pyosalpinx-Eiters in bezug auf das Peritoneum.
-

